

有効成分が浸透し効く

サロンパス®

鎮痛消炎プラスター

商品の特長

- 鎮痛消炎成分のサリチル酸メチル10%配合で疲れた筋肉のコリや痛みをほぐします。
- しなやかでやさしい貼りごちで、はがす時も痛くありません。
- ちょっと大きめサイズなので、こった部位を上手にカバーします。
- 目立ちにくいベージュ色採用で、貼っていることが気になりません。
- はがれにくい「丸かど®」採用で、衣類などでこすれてもはがれにくくなりました。

⚠️ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (3)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸メチル	10.0g
l-メントール	3.0g
ビタミンE酢酸エステル	2.0g

添加物として、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、テルペン樹脂、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含みます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。

《包 装》4.6cm×7.2cm…40枚入、80枚入、120枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)



HELLO! ECO! 有効成分が浸透し効く 第3類医薬品
サロンパス
40枚入 サイズ: 4.6cm x 7.2cm

HELLO! ECO! 40枚入
サイズ: 4.6cm x 7.2cm

Hisamitsu 40枚入
有効成分が浸透し効く

HELLO! ECO! 40枚入
サイズ: 4.6cm x 7.2cm

有効成分が浸透し効く
サロンパス
第3類医薬品

Salonpas
サロンパス
第3類医薬品

有効成分が浸透し効く
サロンパス
第3類医薬品

Salonpas
詳しい情報は
こちらへ

本商品についてのお問い合わせは、お買
い求めの薬局・薬店、又は下記のお客様
相談室までお願い申し上げます。

お各務相談室
☎ 0120-133250
受付時間: 9:00~17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元
久光製薬株式会社
〒841-0017
鳥栖市田代大宮町408番地
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

HELLO! ECO!
しなやかで、
やさしい貼りごち
目立ちにくいベージュ色
ちょっと
大きめサイズ
4.6cm x 7.2cm

鎮痛消炎プラスター 第3類医薬品

サロンパスの
「密着浸透力」とは、
サロンパスを肩こりや腰痛
などの時に皮膚にぴったり
と貼り患部をおおうことで、
有効成分が外部に揮散せ
ず、皮膚から深く浸透し痛
みをジカにとります。それが
サロンパスの「密着浸透力」
です。



4 987188 100554

製造番号 使用期限 第3類医薬品
有効成分が浸透し効く
サロンパス 40枚入
サイズ: 4.6cm x 7.2cm

第3類医薬品
販売名: サロンパス®

ここを
押し開けて
ください。

この説明文書は本剤ととも
に保管し、使用の際にはよく
お読みください。

△ 使用上の注意
⊗ してはいけないこと
[守らないと現在の症状が悪化した
り、副作用が起こりやすくなります。]
次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮膚はく離

効能・効果
肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、
ねんざ、関節痛、しもやけ

用法・用量
1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(3) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸メチル……………10.0g
2-メントール……………3.0g
ビタミンE酢酸エステル……2.0g
添加物として、クイ酸Al、香料、酸化チタン、
ステレン・インフレン、スチレンブロッック共
重合体、テルペン樹脂、ポリソルビトール、
流動パラフィンを含みます。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。