



第2類
医薬品

フェイス[®] Z^α

14枚入
サイズ:7cm×10cm

Hisamitsu[®]

14枚入
サイズ:7cm×10cm

保存に便利なチャック付き

フェイス[®]

ジクロフェナクナトリウム **2.0%** Z^α
W ℓ-メントール配合
ダブル鎮痛処方



当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。

つらい
痛み

24時間
1日1回

ピッタリフィット
全方向伸縮

セルフメディケーション
税 控除 対象

第2類医薬品

製造番号

使用期限

フェイス[®] Z^α 14枚入
第2類医薬品
サイズ:7cm×10cm



フェイス[®] Z^α
第2類医薬品

特長
●効き成分ジクロフェナクナトリウムを2.0%配合した、経皮鎮痛
剤。消炎・解熱・鎮痛・解熱・解熱などのつらい痛みを優れた
効きめをあらわします。●無刺激性なので、就寝時や人前でも気にな
りません。●全方向伸縮で肌にフィットします。



フェイス[®] Z^α
第2類医薬品

★本製品の購入の取り扱い
HELLO! ECOのQRコードから
詳細は
こちら
https://www.hisamitsu.co.jp



お客相談窓口
受付時間/9:00-17:50(土日祝日・年末年始を除く)
0120-133250
副作用情報ホットライン
0120-149-931

★本製品についてのお問い合わせは、お肌への刺激の少ない
薬品、又はお肌の状態によっては、お肌を乾燥、赤らめ、痒い
感の原因となる場合があります。
久米製薬株式会社
〒841-0017 鳥取県鳥取市大東1-10-8 鳥取

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要などき
にすぐ読めるように大切に保管して
ください。

ここを
押し開けて
ください。

包装 14枚(7cm×10cm)
経皮鎮痛消炎テープ剤

第2類医薬品

販売名:フェイス[®]Z^αジクサス[®]

効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎
(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、
ねんざ

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2
枚を患部に貼付してください。ただし、1回あ
たり2枚を超えて使用しないでください。な
お、本成分を含む他の外用剤を併用しないで
ください。

(用法・用量に関連する注意)

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。
(2)用法・用量を厳守してください。(3)本剤は、痛
みやはれ等の原因になっている病気を治療するの
ではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤
なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)皮
膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所
に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発
疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないこと
を確かめてから使用してください。(5)1回あたり、24
時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ
患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、
かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確か
めてから使用してください。(6)同じ部位に他の外用
剤を併用しないでください。(7)汗をかいたり、患部
がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してく
ださい。

成分・分量 (膏体100g中)

ジクロフェナクナトリウム…2.0g
ℓ-メントール……………3.5g

添加物として、ステレン/イソブレン/スチレンブロック共重合
体、テルペン樹脂、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、
その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管
してください。(3)他の容器に入れ替えないでくださ
い(誤用の原因になったり、品質が変わることがあり
ます)。(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないでく
ださい。(5)開封後はチャックをしっかり閉めて保管
してください。



5B490A

使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやす
くなります。

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こした
ことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3)
妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みず
むし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用し
ないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用し
ている人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
ある人。(4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎
臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ(6) 次の医薬品の投与
を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リ
チウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロ
イド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込
み阻害剤(7)高齢者。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
ありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、 刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい 脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合
は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声 のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれます。
貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、 刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や 色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、 かゆみ等の症状が全身に広がることがありま す。また日光が当たった部位に症状があらわれ たり、悪化することがあります。	
接触皮膚炎 光線過敏症	

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中
止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談
ください。