

薄い・密着、はがれにくい

のびのびサロンシップ®

フィット®

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

商品の特長

- ここちよい冷感の(微香性)鎮痛消炎冷感シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかり密着。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ®」です。



⚠️ [使用上の注意]

❌ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

【用法・用量】 1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール	2.0g
l-メントール	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開めてください。

《包 装》10cm × 14cm …………… 10枚入、20枚入、40枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日1~2回患部に貼付してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール …………… 2.0g

β-メントール …………… 1.0g

トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エドト酸ナトリウム、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。



製造番号
使用期限

袋 …… PE, M, PET
シールふた …… PP, PET 1E191M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



シップの
サイズ
そのまま

Hisamitsu® 10枚入
サイズ:10cm×14cm

外用薬

経皮鎮痛消炎剤

のびのび®
サロンシップ®
フィット®



当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。



冷感

第3類医薬品

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

シールが破れて
いる時は使用し
ないでください。

シップの端からはがれにくい



丸かど®シップ
▲開け口

薄い・密着

はがれにくいシップ

微香性

詳しい情報は
こちらへ▼



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記のお客様相談室までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

▲当社HELLO!ecol/プロシップ以外の詳細はこちらへ、

お客様相談室: TEL.0120-133250

受付時間 / 9:00~17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

セルフメディケーション
税 優待対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ、読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

〔冷感〕鎮痛消炎シップ剤

販売名: のびのび®サロンシップ®フィット®

10枚入 10cm×14cm

サイズ: 10cm×14cm

〔ご使用方法〕○表面のシールを開け口の
ところから開け、1枚ずつ取り出して
お使いください。○中身の乾燥を防ぐ
ため、ご使用後はシールを元のように
しっかりと閉めてください。

▲ 使用上の注意

※してはいけないこと

守らないと現在の症状
が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。

次の部位には使用しないで
ください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわ
れた場合は副作用の可能
性がありますので、直ちに
使用を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状
がよくならない場合は使用
を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。