

薄い・密着、はがれにくい

のびのびサロンシップ®

フィット® H

〈温感〉鎮痛消炎シップ剤

フィット®

温感

商品の特長

- こちよい温感の(微香性)鎮痛消炎温感シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかり密着。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ®」です。



⚠️ [使用上の注意]

❌ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ

【用法・用量】 1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。
また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (6)打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール	2.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g
l-メントール	1.0g
トウガラシエキス	0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包装》 10cm × 14cm …………… 10枚入、20枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00—17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

効能・効果

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(3)強い刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(6)打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール …………… 2.0g
トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g
Q-メントール …………… 1.0g
トウガラシエキス …………… 0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エトド酸ナトリウム、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4)ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを開けてください。



製造番号

使用期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PP, PET 2E174M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



シップの
サイズ
そのまま

Hisamitsu® 10枚入
サイズ: 10cm×14cm

外用薬

経皮鎮痛消炎剤

のびのび®

サロンシップ®
フィット®H



当社従来品に比べて
包装サイズを小さく
しました。



温感

第3類医薬品

腰痛・肩こり・関節痛などに

シップの端からはがれにくい



丸かど®シップ
▲開け口

薄い・密着

はがれにくいシップ

微香性

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
製造販売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp
お客様相談室: ☎0120-133250
受付時間 / 9:00～17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)
▲当社HELLO!eco!プロジェクトの詳細はこちら。 副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

詳しい情報は
こちらへ▼



セルフメディケーション
税 控 除 対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

《温感》鎮痛消炎シップ剤

販売名:

のびのび®サロンシップ®フィット®H

サイズ:

10枚入 10cm×14cm

【ご使用方法】O表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。O中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようになりしめてください。

▲使用上の注意

※してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。