

**効能・効果**

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ

**用法・用量**

1日1～2回患部に貼付してください。

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(3) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはかしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(6) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

**成分・分量**

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール …… 2.0g  
 トコフェロール酢酸エステル … 1.0g  
 0-メントール …… 1.0g  
 トウガラシエキス …… 0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸ナトリウム水和物、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。



製造番号  
使用期限

袋 : PE, M, PET  
シールふた : PP, PET 2E192M

1枚ずつ  
取り出しやすい  
ポケシップ®



当社従来品に比べて  
薬袋のプラスチック  
使用量を減らしました。

Hisamitsu® 10枚入  
サイズ: 10cm×14cm

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

のびのび® 第3類医薬品  
サロンシップ® フィット® H

温感  
フィット®

中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールをしっかりと閉めてください。

シップの端からはがれにくい



丸かど® シップ

薄い・密着  
はがれにくいシップ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**  
 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地  
<https://www.hisamitsu.co.jp>  
 ▲当社HELLO!lecoプロジェクトの詳細はこちらへ。 副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

微香性

詳しい情報は  
こちらへ▼



お客様相談室: TEL.0120-133250  
 受付時間 / 9:00-17:50  
 (土日・祝日・会社休日を除く)

セルフメディケーション  
税 控除 対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてよく読めるように大切に保管してください。

**第3類医薬品**

〈温感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名:

のびのび®サロンシップ®フィット®H

サイズ: 10枚入 10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようにしっかりと閉めてください。

**使用上の注意**

☒してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。