

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

皮膚疾患治療薬

第2類医薬品

コーチソン 雪の元

本剤は皮膚の炎症とかゆみをおさえる副腎皮質ホルモン剤ヒドロコルチゾン酢酸エステルと、抗ヒスタミン剤を配合しておりますので、かゆみがひどく、炎症を伴うしつしんなどの皮膚病に効果的です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないこと
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 顔面には、広範囲に使用しないこと
- 長期連用しないこと

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能・効果》

アレルギー性皮膚炎、疱疹状皮膚炎、あかぎれ、かゆみ止め、くさ、しっしん、しもやけ、ひび、凍傷、やけど、痔疾、あせも、皮膚瘙痒症、肛門瘙痒症、虫さされ

《用法・用量》

1日2~3回患部に適当量を塗擦してください。

あるいは症状に応じガーゼに延ばして患部に貼付してください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

《成分・分量》 本品(100.3 g)中

ヒドロコルチゾン酢酸エステル……………0.5 g

ジフェンヒドラミン……………0.5 g

酸化亜鉛……………8.73 g

添加物として、バレイショデンプン、dl-カンフル、d-ボルネオール、パラフィン、ワセリンを含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地

第②類医薬品

コーチゾン軟膏

しっしん・かゆみ・アレルギー性皮膚炎に


皮 膚 病 薬

注 意

- 1.次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 2.顔面には、広範囲に使用しないでください
- 3.使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4.使用に際しては、説明文書をよく読んでください
- 5.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 6.小児の手の届かない所に保管してください

セルフメディケーション
税控除対象

10g



紙 台紙
容器 キャップ 袋

製造販売元 株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地


ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮膚疾患治療薬 販売名:コーチゾン雪の元

第②類医薬品



使用上の注意



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の部位には使用しないでください

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2.顔面には、広範囲に使用しないでください

3.長期連用しないでください



相談すること

1.次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量

1日2~3回患部に適量を塗擦してください。

あるいは症状に応じガーゼに延ばして患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)外用にのみ使用し、内服しないでください。

効能・効果

アレルギー性皮膚炎、疱疹状皮膚炎、あかぎれ、かゆみ止め、くさ、しつしん、しもやけ、ひび、凍傷、やけど、痔疾、あせも、皮膚うず症、肛門うず症、虫さされ

成分・分量 (100.3g)中

成 分	分 量	成 分	分 量	成 分	分 量
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g	ジフェンヒドラミン	0.5g	酸化亜鉛	8.73g

添加物として、バレイショデンブン、dl-カンフル、d-ボルネオール、パラフィン、ワセリンを含有します。

保管及び取扱上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。


(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

副作用被害救済制度
0120-149-931

2301-PLP



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

TEL 0744-22-2440

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)