

つらい 湿疹・皮膚炎の 治療薬

セルフメディケーション
税 控除 対象

10g






ステロイド外用剤

ベタメタゾン吉草酸エステル配合

レチナートVS軟膏

第②類医薬品

お薬の塗り方



- ① お薬を指にとります。
- ② 患部に乗せます。
- ③ 擦りこまずに患部を覆うようにやさしく伸ばします。
塗った直後は表面がべたつくくらいが適切です。

- 化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。

湿疹・皮膚炎治療薬 しっしん・かぶれ・しもやけ・虫さされ・じんましん

患部を保護する
軟膏タイプ



開け口

このような使用はお控えください



本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こした方

本剤の長期連用



2301-AHI

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

湿疹・皮膚炎治療薬

販売名:レチナートVS軟膏

第②類医薬品

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日1回～数回 適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。又、おむつのあたる部分に使うときは、ぴったりとしたおむつやビニール製の密封性のあるパンツは使用しないでください。
- (6) 化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。

成分・分量(100g中) | ベタメタゾン吉草酸エステル 0.12g

はたらき | ステロイド性の抗炎症作用により、湿疹、かぶれなどによる炎症を抑え、かゆみを鎮めます。

添加物：
流動パラフィン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2)目、目の周囲。
3. 顔面には、広範囲に使用しないでください
4. 長期連用しないでください

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までお願いします。
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口
TEL:076(421)5531
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



発売元 製造販売元
富山めぐみ製薬株式会社 株式会社 雪の元本店
富山県富山市三番町3-10 奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第②類医薬品

レチナートVS
軟膏

使用期限
製造番号