

貼りなおし\*  
OK!

肩こり・腰痛・筋肉痛・打ち身に

冷感

コリ・痛みをやわらげる

第3類医薬品

# ハリックス 55 EX A

ピタッと密着はがれにくい  
高伸縮性ニット支持体

肌にやさしい  
弱酸性・高含水基剤採用

全方向伸縮自在

## ダブル W 消炎効果

サリチル酸グリコール

+

グリチルレチン酸

プラス配合

税 控除対象

(1枚14×10cm)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# コリ・痛みをやわらげる／患部を冷やす 第3類医薬品 ハリックス55EX冷感A

## 微香性 鎮痛消炎パップ剤

### 特長

#### 1. ダブル消炎効果で、肩こり・腰痛・筋肉痛などの症状に優れた効き目を発揮。

サリチル酸グリコールに加え、抗炎症成分グリチルレチン酸を配合。患部の症状を鎮め、痛みをやわらげます。

#### 2. 冷却効果に優れ、しかも肌にやさしい。


弱酸性・高含水基剤を採用しています。

#### 3. ひじ・ひざ・足首など、動きのはげしい部位にもピタッと密着、はがれにくい。

全方向伸縮自在のニット支持体を採用。さらに、粘着力が強く皮膚刺激の少ないポリアクリル酸系粘着付与剤を配合。

※1度貼って上手に貼れなかった場合に貼りなおしができ、はがれにくくなっています。

#### 4. 心地よい清涼感が長く持続します。



関節部にもピタリと貼れます

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能

肩こり、腰痛、打撲(うちみ)、捻挫(ねんざ)、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛

### 用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときはよく拭きとってからお貼りください。
- 患部の広さに応じ、フィルムの上から適当な大きさに切ってご使用ください。

### 成分 膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中

有効成分	分量	はたらき
サリチル酸グリコール	2.0g	炎症、痛みをおさえます。
グリチルレチン酸	0.05g	炎症をおさえます。
l-メントール	1.0g	痛みをおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血流を改善します。

添加物として、ポリソルベート80、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、エドト酸Na、pH調整剤、その他2成分を含有。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折りまげて外気にふれないようにしてください。
- 使用期限(箱、袋に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

#### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記に  
お願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室 電話 (0879) 25-2363  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

発売元

テイコクファルマケア株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

(14×10cm)

お押  
ける  
て