

第2類医薬品

ハリワジ® Fb35 温感

ここから押して
開けてください

この箱に記載してある説明文書を
必ずお読みください。また、必要な
時に読めるよう大切に保管してく
ださい。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

使用期限

製造番号

1612

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください

【効能・効果】 関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 表面のライナーをはがし、1日2回を
限度として患部に貼付してください。

△ 用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、痛み等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 汗をかいったり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(6) 強い刺激を感じることがありますので、入浴時の30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(7) 本剤に触れた手で、眼、鼻腔、口唇等の粘膜に触れないよう注意してください。

【成分・分量】 膏体100g中にフェルピナク 3.5g、
ノニル酸ワニリルアミド 0.025g を含有
添加物：スチレン・イソプレン・スチレンブロック
共重合体、流動パラフィン、その他4成分を含有する。

【内 容】 7cm×10cm・・・16枚入

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります）。(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

お問い合わせ先

お客さま相談室 ☎0744-52-4741
奈良県高市郡高取町溝水谷1085番地 受付時間9:00～17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931(フリーダイヤル)