

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

肩・腰・関節・筋肉の痛み

ピロキシカム液「キョウワ」

第2類医薬品

95mL

ピロキシカム液「キョウワ」は、有効成分ピロキシカムが皮ふから患部に浸透し、炎症による痛みや腫れを抑える非ステロイド性の消炎・鎮痛外用薬です。

【特 徴】

1. 有効成分であるピロキシカムは、痛みや炎症の原因であるプロスタグランジン(発痛物質)の生成をおさえて、肩や腰の痛みをやわらげます。
2. 患部に速やかに浸透し、効果を発揮します。
3. においが気にならず、さわやかな清涼感が持続します。

————— ピロキシカム液「キョウワ」は、こんな時に —————



スポーツなどによる
筋肉の痛み



仕事や家事などによる
腰の痛み



ひじ、ひざ、手首などの
関節の痛み

このほか、
仕事や家事などによる肩こりに伴う肩の痛み
スポーツなどによる打ち身・捻挫に

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1)本剤又はピロキシカム製剤によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2)今までにぜんそくを起こしたことがある人。(ぜんそくのある人が抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を起こすことがあります)
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4)15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)水虫、たむし等又は化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、腫脹(はれ)、水疱、落屑(皮ふ片の細かい脱落)、光線過敏症(日光が当たった部位に起こる炎症)

- (2)1週間程度使用しても症状の改善がみられない場合。

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日3～4回適量を患部に塗布します。

*用法・用量に関する注意

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2)定められた用法・用量を守ってください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)長期連用しないでください。

【成分】(100mL中)

成分	分量	はたらき
ピロキシカム	0.5g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをやわらげます。

添加物として、*l*-メントール、トリイソプロパノールアミン、*n*-オクタセチルショ糖変性アルコールを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)キャップをしっかり締めて直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管してください。
- (3)火気に近づけないでください。
- (4)薬剤が衣類に付くと、生地によっては(ウール、絹等)着色し、落ちないことがあります。着色をさけるため、塗擦後はよく乾かしてから着衣してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<お問い合わせ先>

(1)購入した薬局・薬店

(2)協和新薬株式会社

電話：048-942-1445

〔受付時間：9時～17時まで(土・日・祝日を除く)〕

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 **協和新薬株式会社**

〒340-0045 埼玉県草加市小山1-28-8