

効能・効果 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日1回～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼布します。

注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 定められた用法、用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 直射日光の当たらない、涼しい場所に密栓して保管してください。
- (7) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

非ステロイド

第2類医薬品

あせも

かぶれ・かゆみに

デビルホワイト

de ville white

30g

協和新薬株式会社

有効成分(100g中)

成分	含量	はたらき
酸化亜鉛	10g	創面などを乾燥させます。
リドカイン	1g	かゆみを感じなくします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1g	かゆみなどの症状を抑える効果をあらわします。

添加物としてカルメロースナトリウム、ポリオキシエチレンアラキルエーテル・ステアリルアルコール混合物、ポリソルベート60、エデト酸ナトリウム水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ハッカ油、*l*-メントール、パラベンを使用しています。

〈お問い合わせ先〉

- (1) 購入した薬局・薬店
- (2) 協和新薬株式会社

住所：埼玉県草加市小山1-28-8

電話：048-942-1445

〔受付時間：9時～17時まで(土・日・祝日を除く)〕

副作用被害救済制度：電話 0120-149-931


〈製造販売元〉協和新薬株式会社 埼玉県草加市小山1-28-8

A

第2類
医薬品

デビルホワイト

⚠ 使用上の注意

 **してはいけないこと** 飲んだり、眼科用として使用しないで下さい。

 **相談すること**

- 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 今までに、薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 患部が広範囲の人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
 - (4) 医師の治療を受けている人
- 2 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合
(関係部位) 皮膚 (症状) 発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等
 - (2) 数日間、使用しても症状がよくならない場合

製造番号

使用期限