

M017

製造番号
使用期限



1

第②類医薬品 20g

虫さされ・かゆみに
クイッククリーム
3種類の
かゆみ止め
成分
清涼成分
殺菌成分
抗炎症成分

蚊・タニシ・ムシ・ムカデ・クワガタなどによる



かまんできない症状を抑えます。

3つの作用で

- かゆみ止め 作用
- 消炎 作用
- 殺菌 作用



いろいろな虫さされにかゆみはこれ

B2403

虫さされ
かまんできない
湿疹、かゆみに
清涼成分W配合で
スーッと速く効く！

あせも かぶれ ひんましん
クイッククリーム

鎮痒消炎薬 (税) 控除対象

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 デイタクイッククリーム 第②類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

△使用上の注意

- ⊗してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
 3. 長期連用しないでください

- ※相談すること**
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむしたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、ひんましん、あせも、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用してください。

成分・分量

(100g中) ジフェニヒドラミン塩酸塩 1.0g、デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g、トメントール 3.5g、dl-カンフル 1.0g、クロタミトン 5.0g、イソプロピルメチルフェニール 0.1g、添加物として、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アロピレングリコール、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシニルポリマー、セバシン酸ジエチル、エトキシナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ジソプロパノールアミンを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 使用後はキャップをしっかりと締めてください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本剤について、何かお支払いの点がございますら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

鎮痒消炎薬
クイッククリーム
第②類医薬品

鎮痒消炎薬
クイッククリーム
第②類医薬品