

開け口

外用鎮痛
消炎薬

販売名

ビタトール®

インドメタシン液EX

第2類医薬品

【効能・効果】

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【成分・分量】1mL中

インドメタシン…… 10mg
L-メントール……… 60mg
添加物:アスピリン酸ジソプロピル、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ジブチルヒドロキシトルエン、チオ硫酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、エタノール

【用法・用量】

1日4回を限度として、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 11歳未満の小児に使用させないでください。(3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。(5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないでください。(6) 本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(7) 定められた用法、用量を厳守してください。

【容器の使い方】

スポンジの面を患部にゆっくり押し当て、スポンジ全体に薬液をしみ込ませてからご使用ください。(薬液がスポンジに十分しみ込んでいないと、スポンジが破れるおそれがあります。)

製造販売元

新生薬品株式会社
富山県中新川郡上市町横越16番1

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。

製品についてのお問い合わせはお買い求めのお店、又は下記までお願いします。

【受付時間】

9:00~17:00

(土、日及び祝日は除く)

【新生薬品株式会社 消費者相談窓口】

電話番号 076-472-0361

F930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

内容量 100mL



副作用被害救済制度の問合せ先(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 511574 000731



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 11歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないでください。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。