

開け口

外用鎮痛
消炎薬

販売名

第2類医薬品

ビタトレール® フェルビナクローションEX

ご使用に際して、この外箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【成分・分量】1mL中

フェルビナク……………30mg
L-メントール……………60mg
クロルフェニラミン
マレイン酸塩……………1mg

添加物として、1,3-ブチレングリコール、BHT、エタノール、ハアセチルしょ糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ジソプロパノールアミン、水酸化Na、塩酸を含有します。

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(2) 外用にのみ使用してください。(3) 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【容器の使い方】

スポンジの面を患部にゆっくり押し当て、スポンジ全体に薬液をしみ込ませてからご使用ください。(薬液がスポンジに十分しみ込んでいないと、スポンジが破れるおそれがあります。)



製造販売元
新生薬品株式会社
富山県中新川郡上市町横越16番1

VITA TREAL

筋肉痛、関節痛
腰痛、肩こりの痛み



痛み
に
直接効く



ビタトレール® 第2類医薬品
フェルビナク
ローション

EX

100mL

セルフメディケーション
税 控除対象

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限(外箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、アルコール類や油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床等)への本剤の付着は避けてください。

製品についてのお問い合わせはお買い求めのお店、又は下記までお願いいたします。

【受付時間】
9:00~17:00
(土、日及び祝日は除く)

【新生薬品株式会社 消費者相談窓口】
電話番号 076-472-0361
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



SNO