

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第②類医薬品

新デキサG軟膏

新デキサG軟膏は親水性の基剤にすぐれた消炎・鎮痒作用を有するデキサメタゾン酢酸エステル、局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩、殺菌・消毒作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した外用薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないで下さい
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい
3. 長期連用しないで下さい

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

※ 効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成分	分量
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
ジブカイン塩酸塩	0.200g
イソプロピルメチルフェノール	0.100g

添加物としてソルビタン脂肪酸エステル、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート60、エデト酸Na、ピロ亜硫酸Na、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **J-I-F 薬品株式会社** 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

お客様相談室 072-331-0417

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元

J-I-F 薬品株式会社

大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

製造販売元

新生薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町三日市22番地