

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル配合

# エフカイ T クリーム (湿疹・皮膚炎治療薬)

第②類医薬品

水仕事などによって、手荒れ、乾燥肌状態になると、皮脂によるバリア機能が弱くなり、外部からの刺激や有害菌などが皮膚の内部にまで入り込んでしまい、湿疹やかゆみの原因となります。さらにそれを搔(か)いてしまうと、さらに角質が荒れるという悪循環を生んで症状を悪くしてしまいます。エフカイ T クリームの主成分であるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグという新しいタイプのステロイド剤で、その高い消炎効果と、同時に配合された3成分の働きによって、湿疹、皮膚炎、かゆみなどを鎮めます。

アンテドラッグとは…皮膚表面の患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解されるという、有効性と安全性の両立を目的として開発された薬剤です。

また、本品は低刺激性のクリームで、よくのびてペタつかない、さっぱりとした使用感です。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

##### 1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。

##### 2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

##### 3. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

##### 3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】


湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
  - (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
  - (4)外用にのみ使用してください。
  - (5)本剤の使用後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
- チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し ●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。  
出してください。(①→②)



折り曲げないでください。

折りたたまないでください。

## 【成分・分量・はたらき】(1g中)

成分	1g中	はたらき
ブレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル	1.5mg	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を抑えます。
クロタミトン	50mg	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、ステアリルアルコール・セタノール・トリエタノールアミン・パラベン・プロピレングリコール・ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油・ポリソルベート60・カルボキシビニルポリマー・セバシン酸ジエチルを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いします。

万協製薬株式会社

電話0598-37-2088 受付時間AM10:00~PM5:00(ただし、土、日、祝祭日を除きます。)

発売元

東和製薬株式会社  
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1229番地

製造販売元

万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142