

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 頭皮のかゆみしっしんに デオブ兰卡EX液α

第2類医薬品

鎮痒消炎剤

## 【特徴】

1. 8つの有効成分が、つらい頭皮のかゆみ、しっしんに効きます
2. プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンデドラッグステロイド)配合
3. l-メントール配合でスーッと爽やかな使い心地です
4. 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です



## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

#### 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

#### 3. 長期連用しないでください



### ■ 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もお読みください。

## 効能・効果

かゆみ、しっしん、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

## 用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。
- (5)患部が傷になってしまっている場合は、塗布したときにしみる場合があります。




## 容器の使用法

- (1)使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
- (2)使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)

【使用前】  
2~3回空押しします。

【使用中】



## 成分・分量 100mL中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
ブドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンデラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	しっしん、皮膚炎等の炎症をしずめます
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます
クロタミトン	3.0g	かゆみを抑えます
グリチルリチン酸二カリウム	0.2g	炎症をしずめます
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやくしずめます
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります
アラントイン	0.2g	皮膚組織の修復を助けます

添加物として、1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、疎水化ヒドロキシシプロピルメチルセルロース、エタノール、pH調節剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00~17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

発売元  日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元  万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1 169-142