

**【保管及び取り扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。
- (5) イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサリー類、時計、寝具、家具、床、化学繊維、プラスチック類、皮製品などに付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。

開封口

気になる耳などの

かゆみ



4つの有効成分配合

✓ かゆみを鎮める

✓ 炎症を抑える

第②類医薬品

製造 万協製薬株式会社  
販売元 三重県多気郡多気町五柱169-142

万協製薬株式会社  
【お客様相談室】  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



内容量 20mL MADE IN JAPAN

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【販売名】ヒフルER液

第②類医薬品  
鎮痒消炎薬

**▲ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の部位には使用しないでください。(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし(2) 目の周囲、粘膜等、2. 顔面には、広範囲に使用しないでください  
3. 長期連用しないでください

**⚠ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 湿潤やただれのひどい人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくなるしない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

**【効能・効果】**湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

**【用法・用量】**1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈耳に使用する際の容器のご使用方法〉

●本品は点耳薬ではありません。耳の中に直接滴下しないでください。✕  
※本品に綿棒は付属されていません。




1. 平らな所にティッシュ等を敷いた上でご使用ください。(薬液が過剰に出てこぼれる場合があります)

2. 容器の先端を綿棒に軽く当ててください。本体を軽く押し薬液を出して、綿棒全体にしみこませてください。

**【容器の本体部分を強く押さないでください。】**

**薬液が過剰に出る場合があります。】**



3. 薬液がついた綿棒で患部に塗布してください。(塗布する際は、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがありますので、**耳の奥まで綿棒を入れないでください。**綿棒の先から約1.5cmの部分(綿棒の下)を持って、擦らずにやさしく塗布してください。)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児(15才未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみご使用ください。

【耳に使用する際の注意】

(1) 本剤は点耳薬ではありませんので、耳の中に直接滴下しないでください。(2) 薬液が耳の奥にたれないように、【耳に使用する際の容器のご使用方法】を必ず守ってください。(3) 長期連用しないでください。(目安として2週間以内)(4) 鼓膜に穴が開いていることが疑われるまたは耳だれが出ている場合は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(5) 使用后、耳が聞こえにくくなった場合は、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(6) 本剤の使用開始目安年齢は10才以上です。なお、小児(15才未満)だけでの使用はおやめください。(7) 本剤塗布直後はイヤホンや補聴器を使用せず、十分に乾いたことを確認してから使用してください。(目安として1時間後)

**【成分・分量】**100mL中 プレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル0.15g、ジフェニヒドラミン塩酸塩2.0g、グリチルリチン酸二カリウム0.3g、L-メントール1.0g 添加物として、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エドト酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物



治療薬  
ローションタイプの



セルフメディケーション  
税 控除 対象