

ミニクマ
minikuma

液体
キルカミン
α液

かゆみ・虫刺され
第2類医薬品

開け口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねて
います。
ご使用に際して、この箱の記載内容を
必ず読んでください。また、必要な時に
読めるよう大切に保管してください。

【販売名】キルカミンα液
(鎮痒消炎薬)

第2類医薬品

【容量】50mL

【成分・分量】100mL中に次の成分を含みます。
デキサメタゾン酢酸エステル…25mg
(ステロイド成分)

ジフェニヒドラミン塩酸塩 …… 1.0g
l-メントール …… 3.0g
dl-カンフル …… 2.0g
イソプロピルメチルフェノール… 0.1g
添加物として、ジブチルヒドロキシトル
エン、ラウロマクロゴール、エタノール
を含有します。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してくだ
さい。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) キャップをとりはずし、スポンジ部分
を肌へ1～2回軽く押し当てて、スポン
ジに薬液をしみ込ませてからご
使用ください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってくだ
さい。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用させてく
ださい。
- (4) 目に入らないよう注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに
水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医
の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密
封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してく
ださい。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わ
ります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー、プラス
チック類、繊維製品、皮革製品、床や
家具などの塗装面等に付着すると変
質することがありますので、付着しな
いように注意してください。
- (6) 使用期限(外箱及び容器に記載)を過
ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 使用後は必ずキャップを十分にしめ
てください。

販売元

白井薬品株式会社
千葉県白井市河原子270番地
お客様窓口：03-6689-7353
(本邦のお願い合わせはこちらの電話番号にお願ひいたします。)
(10:00～17:00/土・日・祝日を除く)

発売元


MED製薬株式会社
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビルB1

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

使用期限
製造番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



ミニクマ
minikuma

液体
キルカミン
α液

かゆみ・虫刺され

素早く浸透
しっかり痒み止め

はれ・赤み
をしずめる

50mL

第2類医薬品

MADE IN JAPAN

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむしたたむし等又は化膿している患部。
 - (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。
 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
 3. 長期連用しないでください。

☞ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむしたたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

A2408

1

500M



4 582698 981206

C061