

チューブの開け方



キャップを裏返して蓋しなおす

ひじ・ひざ 腰・肩のつらい 痛みに

ロキソプロフェン

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキオノフェG2

第2類医薬品

50g

ジェル 50g

クールタイプ

l-メントール配合



省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

〈鎮痛消炎薬〉

【販売名】ロキオノフェG2

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法・用量】

1日3～4回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- 1回あたり8cm(約2g)、1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 使用後は手を洗ってください。

【成分・分量】(100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物…1.13g(無水物として1g)、l-メントール…3.0g、添加物:カルボキシニルポリマー、トリイソプロパノールアミン、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール

ひじ・ひざ・腰・肩のつらい痛みに

ロキソプロフェン

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ジェル

痛みの元に直接浸透



ロキオノフェG2

セルフメディケーション

税控除対象

第2類医薬品


開封年月日

年 月 日

開封時に記入してください

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。
- 火気に近づけないでください。
- メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面に付着すると、変質又は変色することがありますので、付着しないように注意してください。



開封口

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください。

- 目の周囲、粘膜等。
- 皮膚の弱い部位(顔、わきの下等)。
- 湿疹、かぶれ、傷口。
- みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。

4.連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください。)

■ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 次の診断を受けた人。気管支ぜんそく

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.使用後、次の症状が現れることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢・軟便

4.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

万協製薬株式会社  
「お客様相談室」

電話番号 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

火気厳禁  
引火性固体



箱




4 535653 003185

使用期限

製造番号

A2408



MOO3