

(販売名)

フルエUFクリーム

第2類医薬品

20g

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

皮ふ炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 患部を清潔にした後、塗布してください。

【成分・分量(100g中)】

成分	分量	はたらき
ウフェナマート	5.0g	抗炎症作用により、赤みや炎症を鎮めます。
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行促進作用により、皮ふの新陳代謝を促します。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	消炎作用により、炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、雑菌の繁殖を抑えます。

添加物：ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、パルミチン酸セチル、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、 α -オレフィンオリゴマー、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる恐れがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。