



* 2 1 0 8 A 0 5 *

2021年8月改訂 第5版

* 使用上の注意の改訂

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛ゲル剤

肩こり・筋肉の痛みに!

第2類医薬品

コランデスアルファゲル

特長

- ・コランデス α ゲルは、痛みやはれのもとに直接作用するフェルピナク3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- ・フェルピナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- ・ゲルタイプでべたつかず、サラッとした使用感で「スーッと」と患部に浸透していきます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】 腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み


【成分・分量】 本品100g中 フェルピナク……………3.0g
添加物としてエタノール、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、ジイソプロパノールアミン、香料を含有する。

【用法・用量】 1日2～4回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児は使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。

〈使用方法〉



【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 火の中に入れてください。
- (6) 使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用してください。
- (8) 使用後はキャップをしっかり締めてください。

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **白金製薬株式会社**
〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)