

# トチモトの サンシシ末P

第3類医薬品

《日本薬局方サンシシ末》

第3類医薬品

## トチモトの サンシシ末P

内容量 500g

**【使用上の注意】** 裏面をよくお読みください。

**【成分及び分量又は本質】** 本品1g中 日本薬局方サンシシ末1g

**【効能又は効果】** うちみ、ねんざ

**【用法及び用量】**

若干のコムギ粉と混ぜ、水で練って外用してください。

- (1)定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



4 987466 121110

副作用被害救済制度

0120-149-931

## 【使用上の注意】

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください 小麦アレルギーのある人 (小麦と混ぜ、水で練って外用するため)
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

[脱酸素剤入]

使用期限

株式会社 **橋本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730