

ご使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみ

フジアロー[®]EX10ゲル 〈ゲル〉

◆フジアローEX10ゲルは、アンテドラッグステロイドであるプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)を含む10種類の有効成分を配合した塗り広げやすいゲルタイプのお薬です。

アンテドラッグステロイドとは

皮膚表面の患部で優れた効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性の物質に分解される性質を持つ成分です。

⚠️使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 ・ 効 果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

裏面もお読みください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量をお守りください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
- (5)本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
- (6)外用にのみ使用してください。
- (7)本剤を塗布後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
※擦り込むように塗ると、ゲルが固まり肌から剥がれることがありますので、薄くのばし肌のにせるように塗布してください。

成分・分量

100g中

成分	分量	はたらき
プレドニゾン/吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15g	皮膚のかゆみや炎症等を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により痛み、かゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	0.2g	皮膚の炎症やかぶれを抑えます。
クロタミトン	5.0g	患部のかゆみをしずめます。
サリチル酸グリコール	1.0g	炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
アラントイン	0.2g	皮膚組織の修復を助けます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0g	

添加物:エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸ナトリウム液、ヒドロキシプロピルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5)次の物には付着させないでください。(変質又は変色する場合があります。)
床や家具等の塗装面、メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。
- (7)揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかり締めてください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 048-648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地