

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

虫さされ・かゆみ・肩のこり

外用鎮痒消炎薬

シントエーワンス

## 特長

かゆみ、痛みを爽快な刺激感と共に取り除き、血行を促進して筋肉疲労を軽減します。また、抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラミン塩酸塩が虫さされのかゆみ・炎症にも効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)すり傷、切り傷



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 【効能・効果】

毒虫（蚊、蚤、蜂）の刺傷、かゆみ、運動後の筋肉疲労、肩の凝り、しもやけ、打身、くじき、神経痛、関節炎、頭痛、リウマチ、鼻づまり、せきの湿布

## 【用法・用量】

1日数回患部に塗布、又は擦りこんでください。

頭痛、鼻づまり、せきの湿布の場合：ひたい、鼻、のど等症状のある個所に近い皮膚に塗布してください。

（必ず裏面もお読みください）

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

## 【成分・分量】

成分名	分量 (1g中)	作用等
サリチル酸メチル	60mg	局所刺激作用により血流を改善し、痛みを抑えます。
カンフル	80mg	局所刺激作用、局所麻酔作用、鎮痛作用により、血行を改善し、かゆみ、痛みを抑えます。
l-メントール	40mg	局所の知覚を鈍麻し、痛み、かゆみを抑えます。
ユーカリ油	2.5mg	爽快な刺激感により痛み、かゆみを軽減し、また、せきを抑えます。
チモール	8mg	防腐・殺菌作用があります。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみ等の炎症症状を抑えます。

添加物：セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ステアリン酸、水酸化カリウム

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、アルコール類や油脂類などで変質・変色のおそれのあるもの(プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床など)への本剤の付着は避けてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口(9:00~17:00(土、日及び祝日を除く))  
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1  
電話番号 (076)472-0361

製造販売元

**新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越16番1

SN0