

2020年6月 作成

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。
また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

消炎外用薬


あせも、かぶれ、じんましんに

第3類医薬品

アネミン[®]ローション

製品の特徴

アネミンローションは、お肌と同じ弱酸性でべたつきの少ない無色透明のローションです。皮膚におきた炎症を鎮めるジフェンヒドラミン塩酸塩と皮膚表面の雑菌を殺菌消毒するベンザルコニウム塩化物液を配合しています。これらの成分のはたらきにより、あせも、かぶれ、じんましんなどの皮膚症状の改善に効果的です。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)
次の部位には使用しないこと。

目の周囲、粘膜等。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

あせも、ただれ、かぶれ、じんましん、虫さされ。

用法用量

適量をとり、患部に塗布または塗擦する。

裏面に続く

〈用法用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。

使用方法

肌に直接もしくは手や脱脂綿などにとって使用してください。

- キャップを取る
- おす
- キャップをする

注意



ノズル部分を押すと薬液
が泡状になって出ます。
そのまま手などにとって
お使いください。
ノズルは回さないでくだ
さい。

キャップをしてから、
立てて保管をしてく
ださい。



成分分量 100mL中

| 成 分 | 分 量 | は た ら き |
|-------------------|--------|---|
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 1000mg | 抗ヒスタミン剤で炎症やかゆみを鎮めます。 |
| ベンザルコニウム塩化物液(10%) | 1mL | 刺激の少ない殺菌消毒作用で皮膚表面の雑菌をのぞきます。 添加物としてグリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸水和物、香料を含有する。 |

保管および取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

問い合わせ先

- 購入した薬局・薬店
- 健創製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3527-3690
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ 0120-149-931

©2006
200mL用