

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

外用皮膚疾患用薬

第②類医薬品

協和アセモ軟膏

◆協和アセモ軟膏は、ステロイド薬、局所麻酔薬、殺菌成分、抗ヒスタミン剤、保護成分を配合したあせもなどの外用皮膚疾患用薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないで下さい
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい
3. 長期連用しないで下さい
4. 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、 持続的な刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、しもやけ、湿疹、皮膚炎、じんましん

用法・用量

1日2～3回患部に塗布又は塗擦して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないよう注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 (100g中)

成分	含量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.2g	ステロイド剤で、炎症に優れた効果があります。
アミノ安息香酸エチル	0.3g	局所麻酔作用を有し、痛み、痒みを鎮めます。
サリチル酸メチル	1.0g	痛みをやわらげる作用があります。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.1g	広い範囲に抗菌力を持つ殺菌消毒剤です。
ジフェンヒドラミン	0.5g	抗ヒスタミン作用により、かゆみ、炎症を鎮めます。
酸化亜鉛	5.0g	皮膚を保護し、きずなどの乾燥を早めます。

添加物として、ラノリン、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、グリセリン、パレシヨデンブ、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンラノリン、トコフェロール酢酸エステル、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

 フリーダイヤル **0120-468771**

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**
営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142