

水虫・たむしに

ブテナフィン塩酸塩配合

エプールV9水虫液

第②類医薬品

30mL

液 30mL

1日1回



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) 火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (7) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等につかないようにしてください。

目には入れないこと

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ (エタノール)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社 お客様相談室
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)



4 535653 003086



水虫 たむしに

ブテナフィン塩酸塩配合

9つの 液
有効成分配合



エプールV9水虫液

セルフメディケーション

税 控除 対象

第②類
医薬品

開封口

第②類医薬品

〈みずむし・たむし用薬〉

【販売名】エプールV9水虫液

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【成分・分量】(100g中)

ブテナフィン塩酸塩 1.0g
 イソプロピルメチルフェニール 0.3g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g
 クロタミン 5.0g
 リドカイン 2.0g
 アラントイン 0.1g
 グリチルルチン酸 0.5g
 dl-カンフル 1.0g
 トーメントール 1.0g
 添加物:1,3-ブチレングリコール、マ
 クロゴール、リン酸、エタノール

(成分に関連する注意)

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみる場合があります。

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【容器の使用法】

●使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)

●使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
 ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないでください
 (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等。
 (2) 湿疹。
 (3) 湿瘍、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

☞ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 乳幼児。
 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
 (6) 患部が化膿している人。
 (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かかはつきりしない人。
 (陰のうにかゆみ、ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水泡、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

A2408

上段は使用期限、
下段は製造番号です

1



10M1