



中栓にご注意ください

ご使用に際し、この添付文書を必ずお読み下さい。また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
☆最初にキャップを開封する際、中栓が飛び出すことがありますので、中栓や液が目に入らないようご注意ください。

第2類医薬品

F-GEN

ATHLETE'S FOOT MEDICINE

水虫・たむし（いんきんたむし、ぜにたむし）はカビの一種である白癬菌の増殖によって起こる皮膚病です。この白癬菌は表皮の角質層下に寄生しますので、その治療には角質層下に薬剤を浸透させることが大切です。

水虫薬エフゲンは白癬菌に対して抗菌作用のあるウンデシレン酸と角質層を軟化させ浸透性を高めるサリチル酸を配合した水虫・たむし治療薬です。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のある患部。



相談すること

1、次の人は使用前に医師、薬剤師又は、登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。(2)乳幼児。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)患部が顔面又は広範囲の人。(5)患部が化膿している人。
(6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因の場合が多い)

2、使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は、登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3、2週間位使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は、登録販売者にご相談ください。

効能・効果 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

大人1日1～2回適量を患部に塗布する。

患部をよく洗ってから薬剤を塗布しますと皮膚が柔らかくなり薬剤の浸透を助けます。このことから入浴後の塗布が効果的です。水虫治療は表面上の症状で判断することなく、白癬菌がいなくなるまで継続することが肝要です。通気性の悪い靴下などはなるべく使用をさけてください。

(用法及び用量に関する注意事項)

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないようご注意ください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 100mL中

ウンデシレン酸 3.0 g

サリチル酸 4.0 g

添加物としてpH調整剤、アルコールを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをし、密栓した状態で保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

消費者相談窓口

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)
本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までお願いします。

足のマークの
製造販売元 **大源製薬株式会社**



〒660-0085

尼崎市元浜町5丁目79番地 電話番号 06-6418-0278 フリーダイヤル 0120-184-364
受付時間 9:00～17:00(土・日祝を除く) 時間外にもメールでのお問い合わせができます。
ホームページアドレス <http://www.e-daigen.co.jp> メールアドレス f-gen@e-daigen.co.jp