

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

皮膚軟化剤

第3類医薬品

# ユリア軟膏

(20%尿素配合)

ユリア軟膏は、高濃度の尿素の持つ角質水分保持量増加作用及び角質溶解剥離作用を利用し、ひじ、ひざ、かかとなどの角質層をみずみずしく、なめらかにする効果のある軟膏です。

## 【使用上の注意】



**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等 (口腔・鼻腔など)
- (2) 傷口、ひび割れ部位
- (3) かさぶた等で皮膚がはがれているところ
- (4) 炎症部位 (湿疹、ただれ、赤く腫れている等)



## 相談すること

①次の人は使用前に医師または薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状 (例えば湿疹・発赤・かゆみ・かぶれ等) を起こしたことのある人
- (2) 医師による治療を受けている人

②次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 本剤の使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- (2) 目に入った場合 (すぐに水又はぬるま湯であらい、眼科医の診療を受けてください)
- (3) 2週間位使用しても症状の改善がみられない場合

## ●効能

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

## ●用法・用量

一日数回適量を患部に塗擦してください。

### 〈注意〉

- (1)定められた用法をまもり、外用のみ使用し、内服しないでください。
- (2)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## ●成分・分量 (100g中)

尿素	20.0g	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	3.2g
白色ワセリン	20.0g	モノステアリン酸グリセリン	0.8g
プロピレングリコール	9.6g	パラベン	0.16g
ステアリルアルコール	8.0g	精製水	適量
グリセリン	8.0g		

## ●保管および取扱上の注意

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をお守りください。

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記にお願いいたします。  
町田製薬株式会社 お客様相談室  
電話 (03)3466-2441 (大代表)  
受付時間 平日 9:00~17:00

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元 **町田製薬株式会社**

東京都渋谷区笹塚1-35-1

電話 (03)3466-2441 (大代表)