

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮膚軟化剤

# ピアソン<sup>®</sup>Sクリーム

第3類医薬品

かたい皮膚、ひび割れや荒れた手指にうるおいを与えるお肌の治療薬

## ピアソンSクリームの特徴

「ピアソンSクリーム」は、角質軟化効果のある「尿素」を20%、これに血流改善効果をもつ「ビタミンE」と炎症を鎮める「グリチルリチン酸一アンモニウム」を配合し、更に保湿因子や皮脂、細胞間脂質の成分を加えてクリーム基剤にも工夫をしています。

「ピアソンSクリーム」は、皮膚の水分保持能力を高め、硬くなった皮膚をやわらかくしますので、手指の荒れ、赤黒く硬くなるひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、乾燥してかゆくなる乾皮症、カサカサしたさめ肌に効果的です。

(イメージ図)



手の荒れ、乾燥した皮膚

しっとりうるおい肌



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります〕  
次の部位には使用しないでください

- (1) 目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひびわれ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ・赤く腫れているところ）。



### 相談すること


1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬や化粧品などにより刺激症状またはアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感（痛み、熱感、びりびり感）、かさぶたのように皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔裏面もご覧ください〕



20140701

## 〔効能又は効果〕

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

## 〔用法及び用量〕

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

## 〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法を守ってください。化粧品ではないので、顔面には使用しないでください。
- (2) 小児に使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに、水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 〔成分及び分量〕 (本品 100g 中)

成分及び分量	配合成分のはたらき
角質軟化剤 尿 素 20.0g	体内の水分を角質層に取り込むとともに、クリームの中の水分も吸収して保水量を増加します。
抗炎症剤 グリチルリチン酸 一アンモニウム 0.5g	炎症を修復しながら鎮めます。
血流改善剤 トコフェロール 酢酸エステル 0.5g	血行を促進して皮膚の生まれ変わりを活発にします。

添加物として、ステアリン酸ポリオキシル40、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、精製大豆レシチン、乳酸、トリエタノールアミン、グリシン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、1,3-ブチレングリコール、ステアリン酸、セタノール、スクワラン、メチルポリシロキサン、中鎖脂肪酸トリグリセリドを含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

## 〔消費者相談窓口〕

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

電話番号 076-435-1166 (代表)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **新新薬品工業株式会社** 富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931