

第2類
医薬品



90g

〈乾燥性皮膚治療薬〉

【販売名】トラッドUX
【効能・効果】かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

【用法・用量】1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

【用法及び用量に関する注意】

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5)本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(6)化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

万協製薬株式会社

[お客様相談室]

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

使用期限
製造番号

副作用被害救済制度
0120-149-931

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.次の部位には使用しないでください
(1)顔面、目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、瞼等)等。
(2)炎症又は傷のある患部。
(3)引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。
(4)かさぶたの様に皮膚がはがれているところ

⚑ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態 |

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

力サカサ肌のかゆみに効く!

力サつく肌のしつこいかゆみに

かゆ～い
乾燥肌に
トラッドUX

第2類医薬品

尿素
10%

90g



【成分・分量】100g中

尿素…10.0g ジフェニヒドラミン塩酸塩…1.0g d-カンフル…1.0g
リドカイン…2.0g トコフェロール酢酸エステル…0.3g 添加物として、
プロピレングリコール、2,2'2'-ニトリロトリエタノール、パラベン、ポリ
オキシエチレン硬化ヒマジ油、ポリソルベート60、ステアリルアルコール、
セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

A2311