

開け口

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)火気に近づけないでください。
- (4)アルコール等で溶けるおそれのあるもの(メガネのわく、化学繊維、プラスチック類、塗装面等)、床、家具等につかないようにしてください。
- (5)整髪料及びヘアスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- (6)染毛料等を使用している場合は、本剤の使用により、衣類や枕カバー等への色移りが起こることがあるので、注意してください。
- (7)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
新甲賀漢方株式会社
福岡市早良区干隈 3-16-1

製品に関するお問い合わせ
新甲賀漢方株式会社 お客様相談窓口
電話：0120-187-866
(フリーダイヤル)
受付時間：9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元
シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号



第2類医薬品 内容量：180mL

発毛促進薬
カルグロゲン

効能・効果

脱毛(抜毛)の予防、育毛、発毛促進、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、円形脱毛症、びまん性脱毛症、粗糠性脱毛症

用法・用量

1日2~3回、適量を頭髪地肌にすりこみ、軽くマッサージしてください。

【用法・用量に関連する注意】

- 1. 用法・用量を厳守してください。
- 2. 小児に使用する場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4. 薬液のついた手で、目など粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- 5. 洗髪後の使用は効果的ですが、湯上がり直後は発汗しやすいので、ほてりをさましてから使用してください。
- 6. 本剤は頭皮にのみ使用し、飲まないでください。

成分・分量 100mL 中

成分	分量
カルプロニウム塩化物	1.0g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.1g
サリチル酸	0.2g
パントテニールエチルエーテル	1.0g
l-メントール	0.3g

添加物：dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール、pH調整剤

73111921-A



新甲賀漢方



第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 次の部位には使用しないでください。
(1) ぎず、湿疹あるいは炎症(発赤)等のある頭皮
(2) 頭皮以外

☒ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
頭皮	発疹、発赤、かゆみ、はれ、かぶれ
その他	全身性の発汗、それに伴う寒気、ふるえ、吐き気、頭痛

- 3. 使用后、次の症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
頭皮	刺激痛、局所発汗、熱感
手(指先)	手荒れ

使用期限

製造番号

