

第1類医薬品

説明書

[壮年性脱毛症における発毛剤]ミノキシジルローション1%女性用jp

◆特徴◆

○有効成分であるミノキシジルを、1%配合した壮年性脱毛症における女性用の発毛剤です。

○1回の使用量(1mL)を計量できる容器です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 20歳未満の人。

国内での使用経験がありません。

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人は。

妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。

(4) 妊娠、出産に伴い脱毛している人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(5) 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(6) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。

(7) 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。

男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

(8) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(9) 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。

(10) 男性。

本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

血圧が下がる等のおそれがあります。

(2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。

きず等を悪化させることができます。

3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。

また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2) 高血圧の人、低血圧の人。

本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

(3) 心臓又は腎臓に障害のある人。

本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

(4) むくみのある人。

むくみを増強させる可能性が考えられます。

(5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

(6) 高齢者(65歳以上)。

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

(7) 次の診断を受けている人。

甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。

甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|-------|-------------------------------|
| 皮膚 | 頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等 |
| 精神神経系 | 頭痛、気が遠くなる、めまい |
| 循環器 | 胸の痛み、心拍が速くなる |
| 代謝系 | 原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ |

*頭皮以外にあらわれることもあります。

3.6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものがあります。]

4. 使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。

[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものがあります。]

その他の注意

1. 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。

2. 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

3. 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

◆ 効能・効果 ◆

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

◆ 用法・用量 ◆

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

(1) 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがらません。定められた用法・用量を厳守してください。

(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)

(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。

(3) 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。

(4) 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。

(5) アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。

(6) 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。

(7) 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

(8) つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

◆ 成分・分量(100mL中) ◆

| 成分 | 分量 | はたらき |
|----------------|-------|--------------------------|
| ミノキシジル | 1.0g | 発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。 |
| パントテニールエチルエーテル | 1.0g | 毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。 |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.08g | 皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。 |
| I-メントール | 0.3g | 頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。 |

添加物: エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

◆ 保管及び取扱い上の注意 ◆

(1) 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

(4) 火気に近づけないでください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

◆ お問い合わせ先 ◆

シオノケミカル株式会社 学術情報本部

電話 03-5202-0213

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元
シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

《副作用被害救済制度のお問い合わせ先》

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)