

壮年性脱毛症における発毛剤 リザレックコ-フ for Lady

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)
- ① 次の人は使用しないでください。
- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 20歳未満の人。
(国内での使用経験がありません。)
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。又、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
 - 妊娠、出産に伴い脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
 - 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
 - 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)
 - 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。
(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)
 - 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
 - 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
 - 男性。
(本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。)

- ② 次の部位には使用しないでください。

- 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
(血压が下がる等のおそれがあります。)
- きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
(きず等を悪化させることができます。)

- ③ 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)

相談すること

- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。(1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(2)高血圧の人、低血圧の人。(本剤は血压に影響を及ぼす可能性が考えられます。)(3)心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)(4)むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。)(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的の要因が大きいと考えられます。)(6)高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)(7)次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)

- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*頭皮以外にあらわれることもあります。

- ③ 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

- ④ 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。

(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

その他の注意

- 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。(本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。)(2)毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。(3)効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

<この医薬品の対象となる壮年性脱毛症>



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

- 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがらません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
- アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネくわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
- つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量(100mL中)

成分・分量	はたらき
ミノキシジル 1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル 1.0g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル 0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
/-メントール 0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

【無香料】わずかにエタノールなどのニオイがすることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

発売元



興 和 株 式 會 社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元



リヨートーファイン株式会社

〒277-0861 千葉県柏市高田1410番地

容器使用説明書

■塗布方法

1回の使用量(1mL)を以下①～⑤の方法で塗布してください。


この「容器使用説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・マッサージを行う場合は、リザレックコウ for Ladyの使用前をおすすめします。
- ・洗髪後、髪を乾かしてから使用することをおすすめします。

※イラストはイメージです


- ① ボトルを立てた状態で、キャップを
ゆっくり矢印の方向にまわしてはずします。

注意：立てずに斜めや逆さの状態でキャップを
はずすと薬液がたれる可能性があります。



- ② ノズルが真下を向くようにボトルを逆さにします。
2～3秒程度で計量部に薬液がたまります。


注意：ボトルを振らないでください。
薬液がたれる可能性があります。



- ③ 逆さにした状態のまま、ボトル先端の
ノズルを頭皮に垂直にしっかりと押し
当ててください。ノズルが押し込まれ、
計量部の薬液が1回分(1mL)になります。

注意①：ノズルがしっかり押し込まれていないと、
薬液が出過ぎることがあります。


注意②：薬液がたれることがあるので、
目に入らないように注意してください。



- ④ 薬液が完全に出なくなるまで、髪の薄い部分(気になる部分)を中心として、
垂直にトントンと1～2cm間隔で塗布を繰り返してください(数十回)。


注意①：同じ部分に長く押し当たると、ボトルを斜めにして
使用すると計量した薬液が流れ出ることがあります。

注意②：薬液がたれることがあるので、目に入らないように注意してください。



- ⑤ 使用後はキャップを矢印の方向にまわしながら
しっかりと閉め、保管してください。

注意：キャップをしっかりと閉めないと、ノズルが押し込まれている状態のままとなり、
次に使用する時に、計量部に薬液がたまりません。



●誤飲防止のため、計量部とボトルははずれにくくなっています。

●保管状態により、薬液が変色(微黄色)することがありますが、製品の品質に問題はありません。

リザレックコウ for Ladyの
詳しい情報はコチラ→



壮年性脱毛症における発毛剤

リザレックコウ for Lady

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

① 次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)20歳未満の人。

(国内での使用経験がありません。)

(3)妊娠又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人の。

(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。又、ミノキシジルは母乳中に移行します。)

(4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。

(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)

(5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。

(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)

(6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)

(7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。

(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

(8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)

(9)頭皮から強く引張るような髪型によって脱毛している人。

(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)

(10)男性。

(本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。)

② 次の部位には使用しないでください。

(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

(血圧が下がる等のおそれがあります。)

(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。

(きず等を悪化させることができます。)

③ 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)

☒ 相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

(2)高血圧の人、低血圧の人。

(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)

(3)心臓又は腎臓に障害のある人。

(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)

(4)むくみのある人。

(むくみを増強させる可能性が考えられます。)

(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。)

(6)高齢者(65歳以上)。

(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)

(7)次の診断を受けている人。

甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。

(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*頭皮以外にあらわれることもあります。

③ 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

④ 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。

(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

☒ その他の注意

(1)毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。

(本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。)

(2)毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

(3)効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

<この医薬品の対象となる壮年性脱毛症>



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

- 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はありません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落してください。
- 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
- アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネや、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
- つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量(100mL中)

成分・分量	はたらき
ミノキシジル 1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル 1.0g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル 0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
I-メントール 0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

【無香料】わずかにエタノールなどのニオイがすることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

発売元

興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元

リヨートーファイン株式会社

〒277-0861 千葉県柏市高田1410番地



容器使用説明書

■塗布方法

1回の使用量(1mL)を以下①～⑤の方法で塗布してください。


この「容器使用説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

- ・マッサージを行う場合は、リザレックコーン for Ladyの使用前をおすすめします。
- ・洗髪後、髪を乾かしてから使用することをおすすめします。

※イラストはイメージです


- 1 ボトルを立てた状態で、キャップをゆっくり
矢印の方向にまわしてはずします。

注意:立てずに斜めや逆さの状態でキャップを
はずすと薬液がたれる可能性があります。




- 2 ノズルが真下を向くようにボトルを逆さにします。
2～3秒程度で計量部に薬液がたまります。

注意:ボトルを振らないでください。
薬液がたれる可能性があります。



- 3 逆さにした状態のまま、ボトル先端の
ノズルを頭皮に垂直にしっかりと押し
当ててください。ノズルが押し込まれ、
計量部の薬液が1回分(1mL)になります。

注意①:ノズルがしっかり押し込まれていないと、
薬液が出過ぎることがあります。
注意②:薬液がたれることがあるので、
目に入らないように注意してください。




- 4 薬液が完全に出なくなるまで、髪の薄い部分(気になる部分)を中心として、
垂直にトントンと1～2cm間隔で塗布を繰り返してください(数十回)。

注意①:同じ部分に長く押し当たると、ボトルを斜めにして使用すると
計量した薬液が流れ出ることがあります。
注意②:薬液がたれることがあるので、目に入らないように注意してください。



- 5 使用後はキャップを矢印の方向にまわしながら
しっかりと閉め、保管してください。

注意:キャップをしっかり閉めないと、ノズルが押し込まれている状態のままとなり、
次に使用する時に、計量部に薬液がたまりません。



●誤飲防止のため、計量部とボトルははずれにくくなっています。

●保管状態により、薬液が変色(微黄色)することがありますが、製品の品質に問題はありません。

リザレックコーン for Ladyの
詳しい情報はコチラ→

