

ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ラカナウバン

第3類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)等
- (2) ただれ、化膿している患部、出血している患部、傷口の大きい患部
- (3) 顔面、頭部
- (4) ヒゲそり、除毛、脱毛等により傷んだ皮膚

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

ひび、あかぎれ、さかむけ、小きりきず、すりきず

用法・用量 患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください。

用法・用量に関連する注意

(1) 用法・用量を守ってください。(2) 患部やその周辺が汚れたまま使用しないでください。(3) 患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用してください。(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(5) 外用にのみ使用し絶対に内服しないでください。(6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。(7) 傷口以外に広く塗らないでください。(8) 傷口に塗ると一瞬しみるがありますが、乾燥するとしみなくなります。(9) 固まった皮膜を無理に剥がそうとすると、皮膚を傷つけてしまう可能性がありますので充分お気を付けください。

成分・分量 (100g中)

ピロキシリン12.0g 添加物として、dl-カンフル、ヒマシ油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(密栓しないと薬剤が固まる恐れがあります)(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) **火気に近づけないでください。**(5) 誤飲(指をしゃぶるなど)の恐れがある場合は使用を中止してください。(6) 使用期限(箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。(7) 衣類、家具、床等につくと、非常にとれにくく、色調に変化をきたす恐れがありますので、使用の際は十分に注意してください。

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます)

開封口