

第3類医薬品 □唇炎・□角炎治療薬

ワチピアLip 10g

5つの有効成分が唇のひびわれ、□角炎を治します

ビタミンB6

ビタミンE

+

- アラントイン
- グリチルレチン酸
- パンテノール配合



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなるらない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ステロイド無配合のクリームです

A1

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

□唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

成分・分量 (100g中)

アラントイン	0.5g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.2g
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	0.1g
パンテノール	0.5g

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※ 冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなることがあります。手で温めてからご使用ください。

※ ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。

口唇炎・口角炎治療薬
クチピアLip

第3類医薬品

口唇炎



110831

口唇炎・口角炎治療薬

クチピアLip

第3類医薬品 10g 1日数回

医薬品のリップクリーム

口唇炎・口角炎

口唇のひびわれを治す

直接塗れるチューブタイプ

ドーム型ヘッド



口唇炎・口角炎治療薬

10g 1日数回

クチピアLip

第3類医薬品

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間：月～金 9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)



4 956622 110831

管理コード
412159A1



管理コード
412159A1