



ゼリア新薬

かすみ目・目の疲れに
エスビヤン[®]40

目薬

〔特徴〕

目を酷使しすぎると目が疲れたり、文字がかすんでみえにくくなるなどの症状があらわれることがあります。働き盛りの方で、“目が疲れやすくなった”とか“新聞を読むときに目がかすむ”等の症状が出始めたなら黄色信号で、目を酷使しすぎているのかもしれない。

エスビヤン40は、このような目の疲れや目のかすみ（目やにの多いときなど）に効果を発揮する、清涼感のあるだいたい色の目薬です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

〔効能・効果〕

目のかすみ（目やにの多いときなど）、目の疲れ、結膜充血、眼腺炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用에만使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。
- (6) 液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

（必ず裏面もお読みください）

〔成分〕

成分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	角膜の乾燥を防いで、目を保護します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節作用により、目の疲れなどを改善します。
シアノコバラミン	0.01%	
酢酸d- α -トコフェロール (ビタミンE)	0.025%	目に栄養を与え、新陳代謝を活性化します。
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(FAD)	0.02%	
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	局所の炎症をしずめ、目のかゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン剤で、アレルギー性の目のかゆみを抑えます。

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、ポビドン、ホウ酸、トメントール、d-ボルネオール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリソルベート80、エタノール、pH調節剤

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。なお、本剤は光による品質の変化を防ぐため、必ず添付の遮光袋に入れてください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

エスビヤンはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11