

マイティア LUMIFY

要指導医薬品

販売名 マイティアルミファイ

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 15歳未満の小児。
- (3) 緑内障または高眼圧症の診断を受けた人。
- (4) 結膜下出血のある人。

2. 使用後は乗物または機械類の運転・操作をしないこと

(眠気、めまい、目のかすみ等があらわれることがある。)

3. 長期連用しないこと



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

目のかゆみ、目やに、なみだ目、まぶたのただれ、まぶたのはれ、
目のかすみ、局所的な充血、はげしい目の痛み、急な視力低下、異物感、
発熱、のどの痛み、せき、鼻水、くしゃみ、倦怠感

- (4) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (5) 授乳中の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血の悪化、かゆみ、はれ(目のまわりを含む)、刺激感、痛み、異物感、なみだ目、目やに、目のかすみ
その他	眠気、めまい、徐脈、血圧低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
角膜混濁	目のかすみ、物が見えにくい、まぶしい、視力の低下

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

効 能

結膜充血

〈効能・効果に関連する注意〉

結膜充血以外の症状がある方は本剤の対象ではありません。(「相談すること」1(3)参照)

用法・用量

年齢	1回量	1日の点眼回数
成人(15歳以上)	1滴を点眼する。	4回まで

点眼間隔は4時間以上あけてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)容器の先を目、まぶた、まつ毛に触れさせないこと(目やにやその他異物等が混入することで、薬液が汚染あるいは混濁することがある。)。また、混濁したものは使用しないこと。
- (2)コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (3)点眼用にのみ使用すること。
- (4)用法・用量を厳守すること。


成 分 1 mL中

プリモニジン酒石酸塩…………… 0.1mg

添加物：濃グリセリン、ホウ酸、ホウ砂、クエン酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物、等張化剤、pH調節剤

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
特に自動車内や暖房器具の近くなど、高温となるおそれのある場所に放置しないこと。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)容器に他のものを入れて使用しないこと。
- (5)他の人と共用しないこと。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
また、使用期限内であっても、キャップ開栓後はすみやかに使用すること。
- (7)保存の状態によっては、容器の先周囲やキャップの内側に薬液中の成分の結晶が付くことがある。このような場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用すること。



本品は決められた時間ごとに使用する製品ではなく、目が充血したときにのみ使用する製品です。

1日4回まで使用できますが、点眼間隔は4時間以上あけてください。

本品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
千寿製薬株式会社「お客様インフォメーション」
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目1番9号
電話 0120-078-552 受付時間：9:00～17:30(土、日、祝日を除く)