

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

疲れ目・充血

第2類医薬品

眼科用薬

スピアFX

ピント調節機能成分配合

スピアFXの特長

- 1 L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウムが目の細胞の機能を改善させます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩がピント調節機能を改善します。
これらの作用より、疲れ目やかすみ目等の症状を緩和します。
- 2 塩酸テトラヒドロソリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、アラントイン、グリチルリチン酸二カリウムが、花粉・ハウスダストなどが原因のアレルギーによる目の充血、かゆみを鎮めます。
- 3 ひんやり、爽快感が持続するクールタイプの目薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなるらない場合。

効能又は効果

○目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法及び用量

1回1~3滴、1日3~6回点眼してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズの装着液として、また、ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

- (5) 点眼用에만使用してください。
- (6) 用法及び用量を厳守してください。
- (7) 強い刺激を感じた場合は、使用をお控えください。

成分及び分量

100mL中

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	20mg	末梢血管を収縮させることにより、結膜の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント機能を改善し、疲れ目の症状を緩和します。
アラントイン	100mg	結膜の炎症をしずめ、目の充血に効果を発揮します。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	アレルギー性の目の炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	目の炎症やかゆみを抑えます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	1,000mg	目の細胞の呼吸を盛んにして、疲れた目の機能を改善させます。


添加物として、ホウ酸、pH調節剤(クエン酸)、L-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80、プロピレングリコール、エデト酸Na、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

<成分及び分量に関連する注意>

点眼後、口の中に甘味を感じることがありますが、成分のグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口の中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。



お問い合わせは

テイカ製薬株式会社

お客様相談係

電話番号：076 (431) 8863 [テイカ製薬(株)]

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

おねがい

- ① ツイストキャップをあける時は必ずキャップを上にして容器の側面を持ち、キャップを手前にひねってあけてください。
(容器の真ん中を持ったままあけると薬液がとびだすことがあります)
キャップはカチッと音がするまでしっかり装着してください。
- ② 品質を保持するため高温下となる所に置かないでください。
自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が劣化することがあります。

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**

富山市荒川一丁目3番27号

TS17-04
A