

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

眼科用薬

# 中京目薬クールファイン

花粉・ハウスダストなどによる目のかゆみ・充血を改善

## 中京目薬クールファインの特徴

1. 有効成分であるクロルフェニラミンマレイン酸塩、イブシロン-アミノカブロン酸、ナファゾリン塩酸塩が、花粉、ハウスダストなどが原因のアレルギーによる目のかゆみ、充血を鎮めます。
2. ひんやり、爽快感が持続するクールタイプの目薬です。
3. 有効成分であるパンテノール、ネオスチグミンメチル硫酸塩は、目の細胞の新陳代謝を促進し、ピント調節機能を改善します。目の疲れや目のかすみ<sup>\*</sup>などの症状を緩和します。  
※目やにの多いときなど



## 使用上の注意

### 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
緑内障

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

## 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴点眼してください。

### 《用法・用量に関連する注意》

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。
- (6) 用法・用量を厳守してください。



容器の先をまぶた、まつ毛に触れないようにしましょう

(裏面につづきます)

## 成分とはたらき


無色澄明な点眼液で次の成分を含んでいます。

成分	含量(100mL中)	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	結膜充血を改善します
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピント調節機能に作用し、目の疲れを改善します
イブシロン-アミノカブロン酸	1000mg	目の炎症を改善します
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目の炎症やかゆみを改善します
パンテノール	100mg	目の組織代謝を活発にします
タウリン	500mg	目に栄養を与え新陳代謝を促し、目の疲れを改善します

添加物として、クエン酸水和物、*l*-メントール、*d**l*-カンフル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に付くことがあります。その場合には、清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



## お客様相談係

電話番号：076 (431) 8863 [テイカ製薬(株)]

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

包装 15mL

## おねがい

品質を保持するため高温下となる所に置かないでください。自動車の車内や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置すると容器が変形したり、薬液の品質が悪化することがあります。




〈発売元〉

 株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北通町2-15-1

〈製造販売元〉

 テイカ製薬株式会社  
富山市荒川一丁目3番27号