

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ROHTO

眼科用薬

新V・ロート
第2類医薬品

新 V・ロート®

13mLと大容量20mLの2タイプがあります。用途に合わせてお選びください。

目の疲れ・眼病予防に。
日常起こりがちな、
様々な目の不快症状に。



大容量20mL

13mL

長い間働き続けると
目の疲れやかすみ、
充血、かゆみなど、
様々な不快症状が
起こりがちです。
そんな時には、この「新V・ロート」。
8種の有効成分をバランスよく配合した
マルチフォーカス処方[®]が、日常起こりがちな
様々な目の不快症状を緩和します。
目全体にゆきわたる気持ちよ良さし心地。
いつまでも大切にしたい目に、
「新V・ロート」がしっかりと効きます。

8種の有効成分をバランスよく組み合わせた 「マルチフォーカス[®] 処方」

【成分】

【はたらき】

● パンテノール

新陳代謝を促進し

● ビタミンB₆

● L-アスパラギン酸カリウム

瞳の呼吸を活性化し

● ネオスチグミンメチル硫酸塩

ピント調節機能を改善し

● コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

角膜を保護し

● グリチルリチン酸二カリウム

炎症の原因に作用して

● クロルフェニラミンマレイン酸塩

ヒスタミンをブロックし

● 塩酸テトラヒドロゾリン

血管を収縮させ

目の疲れを
改善します

目のかゆみを
抑えます

充血を除去します

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように


成分

パンテノール	0.1%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1%
ビタミンB ₆	0.1%	グリチルリチン酸二カリウム	0.1%
L-アスパラギン酸カリウム	1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	塩酸テトラヒドロゾリン	0.01%

添加物として、アミノカプロン酸、塩化Na、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、ゲラニオール、ユーカリ油、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリソルベート80、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問合せ先

製品についてご意見やご要望、お困りごとやお悩みごとがございましたら、お気軽にご連絡ください。あなたのお声におこたえます。



コミュニケーションコール（お客様相談室）

0120-610-755

受付時間／9:00～17:00（土、日、祝除く）