

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

目のかすみ・
かわき(ドライアイ)・疲れに
うるるバランス

点眼薬

第3類医薬品

13 mL

パソコン・携帯電話・テレビの凝視により、まばたきの回数が減ってしまうと、瞳を守る重要な涙も減少し、ドライアイ(目の乾き)症状、バサツキによる違和感・不快感や目の疲れを引き起こしてしまいます。うるるバランスはそんな涙不足の瞳にうるおいを提供する人工涙液型点眼液です。

【特徴】

- ヒトの涙に近似したミネラルバランス(ナトリウムイオン(Na^+)、カリウムイオン(K^+)、カルシウムイオン(Ca^{2+})、マグネシウムイオン(Mg^{2+})、塩化物イオン(Cl^-)、リン酸イオン(PO_4^{3-})、硫酸イオン(SO_4^{2-}))が目の乾き・目の疲れを軽減します。
- アミノ酸類のL-アスパラギン酸カリウムや涙液にも含まれるブドウ糖が、目の酸素補給や栄養補給に寄与し、疲れた目の働きを活発にします。
- 裸眼及びコンタクトレンズを装着しているときの不快な乾燥感をやわらげます。どのタイプ(ソフト・ハード・ O_2 ・使い捨て)にも使用可能です。
- pH、浸透圧比をヒトの涙に近づけた点眼液です。コンタクトを外した後やドライアイ(目の乾き)気味の敏感な目にもやさしい低刺激タイプです。



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人：緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧下さい。

【用法・用量】

1回2～3滴, 1日3～6回点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (100mL中)	はたらき
塩化ナトリウム	733mg	目や角膜に栄養や酸素を運び大切な役割をする涙のミネラル分をこれら塩類が供給します。ヒトの涙に近似したミネラルバランスが目にもうおいを与え、目の疲れを軽減します。
塩化カリウム	127mg	
塩化カルシウム水和物	15mg	
硫酸マグネシウム水和物	10mg	
リン酸水素ナトリウム水和物	273mg	
L-アスパラギン酸カリウム	120mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え目の疲れを癒します。
ブドウ糖	5mg	涙にも含まれるブドウ糖が目にも栄養とうおいを与え、目の疲れを癒します。

添加物として乾燥炭酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物液を含有しています。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共有しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってから使用してください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電話：0942-92-5656

受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発売元  総合メディカル株式会社

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目9-23

製造販売元 佐賀製薬株式会社

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481