

服用の際に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

ラゴリン[®]鼻炎用

花粉症や鼻炎などからくるつらい症状に4つの有効成分がよく効く薬で、中身が溶けやすい液状のソフトカプセルです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病
 - (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
- ※モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する医薬品は以下のようなものがあり、いずれもパーキンソン病の治療に用いられます。また、ソニサミドはてんかんの治療にも用いられます。

●セレギリン塩酸塩 ●ソニサミド ●エンタカポン

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

※裏面も必ずお読みください

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

用法・用量

1日3回、毎食後に次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	2カプセル
7歳以上15歳未満	1カプセル
7歳未満	服用しないでください

【用法・用量に関連する注意】


(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)定められた用法・用量を厳守してください。

(3)右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(カプセルの取り出し図)

(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



成分・分量

1日量6カプセル中に次の成分を含んでいます。

成 分	分量	は た ら き
d-クロルフェニラミンマレーン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどアレルギー症状を抑えます。
塩酸ブソイドエフェドリン	120mg	鼻の粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善します。
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁の分泌を抑え、鼻みず、なみだ目を緩和します。
無水カフェイン	120mg	鼻炎による頭の重い感じを鎮めます。
添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有。		


保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)

(4)ケースに表示してある使用期限を過ぎたものは服用しないでください。



〈お問い合わせ先〉

中央薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 076-493-5010

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元



中央薬品株式会社
富山県富山市西四十物町4-9