

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

花粉・ハウスダストなどによる鼻みず、鼻づまり、くしゃみに

アレルギー専用鼻炎薬

ビエンリックLX

ロラタジン製剤

- ビエンリックLXは第2世代抗ヒスタミン成分のロラタジンを有効成分としたアレルギー専用鼻炎薬です。
眠くなりにくく、1日1回1錠の服用で効果が長く続きます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

- [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]
1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 15才未満の小児。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、催眠鎮静薬等）、エリスロマイシン、シメチジン
 3. 服用前後は飲酒しないでください
 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
肝臓病、腎臓病、てんかん
(3) アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。
(4) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(6) 高齢者。
(7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、かゆみ、じんましん、皮膚が赤くなる、脱毛
呼 吸 器	のどの痛み、鼻の乾燥感
消 化 器	吐き気、嘔吐、腹痛、口唇の乾燥、口内炎、胃炎
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛
循 環 器	動悸、頻脈
そ の 他	眼球の乾燥、耳鳴り、難聴、ほてり、浮腫（顔・手足）、味覚異常、月経不順、胸部不快感、不正子宮出血、胸痛、尿閉

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
てんかん	（てんかん発作既往歴のある人）筋肉の突っ張りや震え、意識障害、発作前の記憶がない。
けいれん	筋肉の発作的な収縮があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢、眠気

効能・効果

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

用法・用量

次の量を食後に服用してください。
なお、毎回同じ時間帯に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	1錠	1日1回（毎回同じ時間帯）
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3) 1週間位服用しても症状の改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (4) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）
- (5) ぬれた手で扱わないでください。
- (6) 寝たままの状態で水なしで服用しないでください。



成分・分量 1錠中

はたらき	成 分	分 量
アレルギー性の鼻炎に効果があります	ロラタジン	10mg

添加物:D-マンニトール、乳糖水和物、L-メントール、香料、クロスボビドン、酢酸ビニル樹脂30%分散液、ステアリン酸Mg、スクラロース

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2