

開封口

**アレルギー
専用点鼻薬**

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意

☒ [してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人には使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
- 長期運用しないでください

相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、眼内障(6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	刺激感、鼻出血、はれ
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 症状の改善がみられてても2週間を超えて使用する場合は、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ノズルの先端はすでに小さな穴があいておりますので、針などで突くのはおやめください。

【用法・用量】

成人(15才以上)及び7才以上の小児:1回に1度ずつ、1日3~5回両鼻腔内に噴霧してください。なお、3時間以上の間隔をおいてください。7才未満は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

- 定められた用法・用量を厳しくください。
- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点鼻用のみ使用してください。

(使用方法)

1. キャップをはずします。

2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまでね部を数回、空押してください。

3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。

4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押して、1回に1度ずつ噴霧してください。
できるだけ垂直に近い角度でお使いください。

5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭き、キャップをして保管してください。

[液が残っている音はするが不出ない時]
液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。
緩やかなカーブがついているので容器を傾げずに噴霧する、無駄なくお使いいただけます。
容器断面図

販売名

アルクイックALGプラス点鼻薬

[効能・効果]

花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和: 鼻水(鼻汁过多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)

[成分・分量] 100mL中
クロモグリ酸ナトリウム………1g
ナフアゾリン塩酸塩…………0.025g
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.25g
ベンゼトニウム塩化物………0.02g
グリチルリチン酸二カリウム…0.3g
添加物としてエデト酸Na、パラベン、等強化剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるので防ぐため)
- 他人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また開封後は使用期限内であつてもなるべく速やかに使用してください。

奥田製薬 お客様相談窓口
電話 06-6351-2100 (代表)
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日を除く)

製造販売元
奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号
<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>

【副作用・併用注意】
副作用: お問い合わせください。
併用注意: お問い合わせください。

【紙】: キャップ
【箱】: 箱
【ボトル】: ポンプ
【ボトル】: ボトル

副作用・併用注意: お問い合わせください。