

開封口

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

〈鼻炎用点鼻薬〉
エパールN点鼻薬 **第2類医薬品**

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和・鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頻嚏

【用法・用量】

次の量を鼻腔内に噴霧してください。

年齢	1回量	1日使用量
成人(15歳以上)及び7歳以上の小児	1～2度ずつ	1～5回(適用期間中は3時間以上おいてください)
7歳未満の小児	使用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- 点鼻用にのみ使用してください。

【成分・分量】(100mL中)

ナファゾリン塩酸塩0.05g、クロロファンタミンマレイン酸塩0.5g、リドカイン0.5g、グリチルリチン酸二カルシウム0.3g、ベンザルコニウム塩化物0.02g添加物として、グリセリン、塩酸を含有します。

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社
「お客様相談室」

電話番号 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし土、日、祝日は除きます)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

内容量：30mL

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 長期適用しないてください

⊗ 相関すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
鼻	はれ、刺激感

また下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けってください。

症状の名前	ショック (アナフィラキシー)
使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる	

- 3日間使用しても症状が中止しない場合は使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

5つの有効成分^{配合}

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性鼻炎に

効く

すぐに抑えたい
鼻みず・
鼻づまり
エパールN点鼻薬




第2類
医薬品

30mL

【保管及び取扱いの注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 他人の人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。



【使用方法】

- キャップをはずします。
- 初めて使用する際は、液を噴霧するまぶたの部分を数回、空押ししてください。
- 右図のように容器を持ち、スプルを鼻腔内に少し差し入れます。

- 静かに鼻を吸い込みながら、はねを下まで押し、1回1度ずつ噴霧してください。
できるだけ鼻血に注意しておきましょう。
- 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでスプルを拭き、キャップをして保管してください。

(液が残っている音はするが出ない時)

- 液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていますが、この容器をかたむけずお使い頂くこと、むだなくお使いいただく必要があります。



4 53653 002522

セルメディケーション

税 控 除 対象

