

# コルゲンユー<sup>TM</sup>点鼻薬

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### ① 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### ② 長期連用しないでください



### 相談すること

#### ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

#### ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

#### ③ 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重

## 成分・分量(100mL中)

ナファゾリン塩酸塩 0.05g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g、リドカイン 0.5g、グリチルリチン酸二カリウム 0.3g、ベンザルコニウム塩化物 0.02g  
[添加物]グリセリン、塩酸

## 用法・用量

下記の量を鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)及び7歳以上の小児	1～2度ずつ	1～5回
7歳未満の幼児	✕ 使用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>


- ① 用法・用量を厳守してください。
- ② 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- ③ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ④ 点鼻用にのみ使用してください。

### <容器の使い方>

1. キャップをはずします。
2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまではね部を数回、空押ししてください。
3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。




4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押して、1回に1度ずつ噴霧してください。  
※できるだけ垂直に近い角度でお使いください。
5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭きキャップをして保管してください。



[液が残っている音はするが出ない時]

液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていますので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使い頂けます。



## 保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 他の人と共用しないでください。
- ⑤ 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



噴霧口を針などで突くのはおやめください。故障の原因となります。

### 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

A2409