

- ①キャップをはずして下さい。
※最初に使用する際は液が出るまで空押しして下さい。



※ノズルは回転できます。

- ②ノズルの先端を患部に向けアツと声を出しながら適量を噴射塗布して下さい。



副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
お問い合わせ先
お客様相談室 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山市横越168

MADE IN JAPAN



新ルルエース のどスプレー^a

のどの痛み・はれ、声がれに

のどスツクリ 爽やか

ホピドンヨード配合



〔特納用〕30mL

第3類医薬品



Daichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

使用方法

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して下さい。

●(用法に関連する注意)

- 用法を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- のどの粘膜面のみ使用して下さい。
- 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。
- 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルの先端を患部に向けアツと声を出しながら適量を噴射塗布して下さい。

成分・分量(100mL中)

ポピドンヨード・・・450mg
添加物：ヨウ化K、グリセリン、トメントール、香料、pH調整剤、エタノール
(成分・分量に関連する注意)

- 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(歯冠等)が変色することがあります。
- 本剤はアルコールを含んでいますので、しみる場合があります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。
- (5)火気に近づけないで下さい。
- (6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

開封口
▼

□腔
咽喉薬

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期運用しないで下さい。

⚠

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (2) 授乳中の人 (3) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状のある人 □内のひのじだれ (5) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありしますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

火気厳禁 第二石油類 水溶性危険等級Ⅲ

新ルルエースのどスプレー^a

第3類医薬品



01 © 登録商標

使用
期限

製造
番号