


①

キャップを  
はずしてください。



\*最初は液が  
出るまで空押しを行ってください。

②



先端を患部に向けて、噴射塗布してください。  
(ノズルは回転できます。)

\*吸入しないように  
アーッと声を出しながら噴射してください。

③

使用後は  
きちんと  
キャップを  
はめて  
保管して  
ください。



発売元

株式会社 淡田館

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室  
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)  
時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168

A淡田館

AZアンドCPCのどスプレー

□内炎にも効く

□口腔咽喉薬

のどの炎症による  
痛み、はれ・

抗炎症成分  
水溶性アズレン

殺菌成分  
CPC

Wの効果



第3類医薬品 30mL

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がれ、口内炎

【成分・分量】 1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)…0.2mg  
セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)…3mg

添加物としてクエン酸Na、グリセリン、l-メントール、エタノール含有

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になります)。品質が変化します。

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5)薬液がこぼれ衣類などに付着した場合は、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

(6)火氣に近づけないでください。

(7)本剤使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

口腔咽喉薬

この箱はお薬とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

△ご使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

長期連用しないでください。

☒ 相談すること

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)口内にひどいただれのある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

□の刺激感

4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●のどや口内への塗布用にのみ使用してください。

●目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。



副作用救済制度 0120-149-931